

副甲狀腺超音波導引酒精注射檢查須知

2012年01月製訂
2023年01月修訂

一、目的

經由本項處置，可使副甲狀腺機能亢進患者 i-PTH、Ca、P、ALK-P 值控制在理想值以內。臨床骨頭酸痛，皮膚癢，及紅眼睛都會大幅改善。

二、檢查前準備

1. 檢查當天請攜帶有照片的健保卡或身分證、同意書
2. 此項檢查，可以進食。
3. 若病患無法配合，醫師可依當時狀況決定是否施行酒精注射
4. 若當天因故無法檢查，請於檢查前一天來電告知，或更改檢查時間。
5. 檢查所需的時間因為受檢者的個別差異有所不同，我們會儘可能準時為您安排檢查。

三、檢查中注意事項

1. 醫師執行處置時請患者平躺於檢查床上，頭部後仰及頸部伸展。
2. 下針時會有些許疼痛感覺，請勿吞口水、請勿說話或擾動以免危險。

四、檢查後衛教指導

1. 注射後請在紗布上加壓止血傷口約十分鐘，技術師查看傷口後再返家。
2. 家後如有患處腫脹、呼吸困難不適情形，請立即至急診處掛號就醫。
3. 注射後若無其他限制即可進食。
4. 門診患者依照醫師約診時間回診。

如有疑問請於上班時間電洽 台北院區 (02)25433535-轉分機 2932

馬偕醫院生理檢查科製

| 文件編號/名稱 | 機密等級 | 生效日 | 版次 | 頁次 |
|-------------------------------------|------|----------|----|----|
| MMH-PHY-TP-1914-004 副甲狀腺超音波細針穿刺檢查須知 | 一般 | 2023/1/2 | 3 | 1 |