

兒童預防接種一覽表

2020.02制定
2023.02審閱

疫苗名稱	出生後疫苗接種時間
B 型肝炎疫苗	24 小時內、 1 個月、 6 個月
卡介表	5 個月 (無接種紀錄者需於國小 1 年級補種)
白喉破傷風非細胞性百日咳、 b 型嗜血桿菌及不活化小兒麻痺五合一疫苗	2 個月、 4 個月 6 個月、 18 個月
13 價結合型肺炎鏈球菌疫苗	2 個月、 4 個月、 12 到 15 個月
A 型肝炎疫苗	12 到 15 個月、隔 6 個月第 2 劑
水痘疫苗	12 個月
麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗	12 個月、滿 5 歲至入國小前
流感疫苗	6 個月至 12 個月、隔 4 週接種第 2 劑(之後每年一劑)
日本腦炎疫苗(活性減毒)	15 個月、 27 個月
A 型肝炎疫苗	12-15 個月、 18-21 個月
白喉破傷風非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺混合疫苗	滿 5 歲至入國小前

接種時請務必攜帶「兒童健康手冊」及「健保卡」



預防接種禁忌症

- ◆ 有急性傳染病接觸史和處於急性傳染病恢復期者。
- ◆ 罹患慢性心臟病、腎臟病、肝病者。
- ◆ 經常罹患蕁麻疹、喘息等過敏性疾病者。
- ◆ 嚴重營養不良者與佝僂病兒。
- ◆ 腹瀉嬰幼兒(一日大便超過**4**次以上者)。
- ◆ 接種百白破混合製劑後出現嚴重的接種後反應，發熱虛脫、休克、抽搐、體溫超過**40.5**°C或其他神經系統症狀後，下次則停用百白破，而只注射白喉及破傷風類毒素（二聯製劑）。
- ◆ 一般感冒、輕度低熱者。



接種後應注意什麼?

型態	接種後症狀	處理方法
全身反應	請密切觀察體溫，偶伴有噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉、全身乏力等症狀，症狀多持續 1 至 2 日可自行消退	體溫超過攝氏 38.5 度，可依醫師指示給予服用退燒藥。
局部反應	注射部位在接種後 12-24 小時可能出現紅腫並伴疼痛，持續 2 至 3 日可自行消退	紅腫較嚴重者，可於 3 天後熱敷，避免抓癢及按摩。
異常反應	接種疫苗後，在數分鐘內出現暈厥、心慌、面色蒼白、手足發麻、全身出汗等症狀	立即讓患兒平臥休息，若症狀未見緩解，請立即就醫。

圖片引自google

若有任何疑問，請洽(02)28094661轉2160 淡水社區醫學中心